



Zabiegi estetyczne w chorobach autoimmunologicznych

Z zabiegów medycyny estetycznej może korzystać każdy. Należy jednak podejść do tego z rozważą i podjąć decyzję w oparciu o wiedzę medyczną. **Niezwykle ważnym jest, aby przed wizytą u lekarza medycyny estetycznej Pacjent skontaktował się ze swoim lekarzem prowadzącym, specjalistą i poinformował go o zamiarach skorzystania z usług medycyny estetycznej. Należy również wykonać badania w kierunku przeciwciał ANA, ponieważ ich niskie miano pozwoli podjąć ostateczną decyzję i zaplanować właściwe działania.**

Większość chorób autoimmunologicznych i niektóre choroby przewlekłe są przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, na przykład z zastosowaniem kwasu hialuronowego (HA) czy toksyny botulinowej. Jeśli jednak Pacjent jest w stanie remisji i lekarz specjalista, u którego się leczymy nie widzi przeciwwskazań do zabiegu, wówczas można go wykonać.

Przeciwwskazania podzielić możemy na dwie grupy:

Bezwzględne- wykonanie zabiegu jest całkowicie zabronione albowiem może się wiązać z wystąpieniem poważnych powikłań, utratą zdrowia a nawet śmiercią. Zabieg można wykonać dopiero po pełnym wyleczeniu Pacjenta.

Względne- istotny jest stopień zaawansowania choroby i wyniki badań w czasie wykonywania zabiegu. Przeciwwskazaniem względnym są również planowane w niedalekiej przyszłości zabiegi, które mogą zakłócić lub negatywnie wpłynąć na końcowy efekt zabiegu. Ważna jest współpraca z pacjentem i jego lekarzem prowadzącym. Należy rozsądnie zaplanować rodzaj zabiegów i czas ich wykonania. Dobrać produkt do indywidualnych potrzeb i w oparciu o aktualne badania mieć pewność, że obecny stan zdrowia jest na tyle dobry, że można bezpiecznie wykonać zabieg.

| Przeciwwskazania względne | Przeciwwskazania bezwzględne |
|---|--|
| Choroby nowotworowe w okresie długotrwałej remisji | Choroby nowotworowe, szczególnie w trakcie leczenia (np. chemioterapii czy radioterapii), ponieważ odporność organizmu w tym czasie jest wyjątkowo słaba. Jakakolwiek ingerencja w układ odpornościowy i podawanie implantu poprzez naruszenie ciągłości skóry jest absolutnie zabronione. |
| Wyrównana cukrzyca | Niewyrównana cukrzyca z uwagi na trudne gojenie się ran. W wyniku choroby dochodzi do zaburzenia krążenia krwi, zniszczeniu ulegają nerwy. Praca układu odpornościowego również nie jest prawidłowa. |
| U pacjentów z predyspozycją do bardzo częstego powstawania opryszczki zwłaszcza w obrębie ust, przed i po zabiegu, prewencyjnie podaje się Heviran. Nawet, jeśli w momencie zabiegu wirus jest nieaktywny i nie ma widocznych zmian, często powiększanie ust kwasem hialuronowym powoduje jego uaktywnienie i wystąpienie opryszczki. | Opryszczka i inne infekcje skórne |
| | Ciąża i okres karmienia piersią, ponieważ w tym okresie organizm kobiety przechodzi wiele zmian, |



| | |
|---|--|
| | również hormonalnych. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak może zareagować na ciało obce, którym HA niewątpliwie jest. Poza tym, w razie powikłań może wystąpić konieczność podania antybiotyku, a jak wiadomo jest to szkodliwe dla płodu. |
| | Tendencja do bliznowców |
| | Choroby tkanki łącznej (toczeń, twardzina, reumatoidalne zapalenie stawów), w których konieczne jest leczenie immunosupresantami, które powodują osłabienie układu odpornościowego i większą podatność na infekcje. |
| | Uczulenie na kwas hialuronowy |
| | Hemofilia- nawet przy mikronakłuciach może wystąpić duże krwawienie, które ciężko zahamować, ponieważ Pacjenci chorujący na hemofilię posiadają we krwi niedostateczną liczbę czynników krzepnięcia. |
| Zespół Hashimoto- jeśli poziom hormonów jest unormowany można wykonać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Jednak wskazane jest zachowanie ostrożności i sumienne stosowanie się do zaleceń lekarskich. | Zespół Hashimoto w trakcie |
| Pacjentom uczulonym na lidokainę możemy zaproponować wypełniacze, które owej lidokainy w składzie nie zawierają, np. <u>Amalian</u> , <u>Princess</u> czy <u>Stylage</u> . Zabieg będzie się wiązał z dyskomfortem, ale również z pewnością, że produkt nie wywoła żadnych skutków ubocznych. | Uczulenie na lidokainę- substancja znieczulająca występująca w większości preparatów z HA |
| | Aparaty ortodontyczne lub planowane zabiegi stomatologiczne |